

PROTOSCOLS CDS revisados por MS

Protoscolos Coronavirus:

Preventivo Protoscolos C (B como alternativa)

Caso Agudo Protoscolos F

Caso grave Protoscolos U

Protoscolos U: como Urgencia, es el antiguo protoscolos 6 + 6 de Clara

- El protoscolos de urgencia también llamado de Choque, o 6 x 6, de Clara y variantes, es utilizado para tratamientos puntuales, no graves pero sí de urgencia, y en tratamientos infecciosos como por ejemplo la infección de orina (cistitis), infección de riñones, infección del oído, gastroenteritis, procesos febriles, intoxicación por alimentos, repentinos vómitos o diarrea, malestar severo sin causa aparente.

Se puede aplicar sobre todo también en casos de dolor severo, donde se pueda observar el aumento rápido y repentino de la infección de una enfermedad desconocida.

Procedimiento: Se toman 6 ml de CDS en 200 ml de agua y después de dos horas se repite, con otros 6 ml más.

Posteriormente, se toman 3 ml en 200 ml de agua cada dos horas hasta completar unas ocho a 10 tomas al día. Al final del día debe haber, una clara mejoría, en caso contrario consulte al médico de urgencias.

- También hay que adaptarse a las tolerancias en cada caso, y se puede tomar como equivalencia por cada gota de CDS = 1 ml de CDS, disuelto en la misma cantidad de agua.

Hay que tener en cuenta que según la enfermedad se puede adaptar la dosis reduciéndola a 4 x 4, por ejemplo (en lugar de los 6 ml señalados más arriba). El CDS generalmente tiene mejor tolerancia, sobre todo cuando se trata de problemas estomacales.

Protoscolos A-Z Tenga en cuenta, nuestros resultados son sólo las evaluaciones de la investigación experimental. No constituyen ningún tipo de consejo o prescripción médica. Postulamos ninguna recomendación a cualquiera, para cualquier condición específica o enfermedad.

Quiero presentar un sistema nuevo de protoscolos por letras, la razón es simple ya que muchas veces se debe combinar varios protoscolos según para que enfermedad, así que puedo combinar fácilmente los protoscolos para su mayor eficacia. Sé que a algunos les va a sonar raro, pero debido a la situación es un intento de crear orden de manera fácil.

Así que podemos enumerar los siguientes protoscolos:

- protoscolos A: como Amateur, que es para todo principiante
- protoscolos B: como Básico, que es el equivalente al antiguo protoscolos 1000
- protoscolos C: como CDS ,el antiguo protoscolos 101 (110)
- protoscolos D: como Dermatológico para la piel
- protoscolos E: como Enemas
- protoscolos F: como Frecuente, el antiguo protoscolos vírico 115 de CDS
- protoscolos G: como Gas, que es utilizado sólo el gas del dióxido

- protocolo H: como Habitación, evitar contagios
- protocolo I: como Insectos y Picaduras
- protocolo J: como Enjuague bucal
- protocolo K: como Kit combinado (con DMSO)
- protocolo L: como Lavado, protocolo de baño
- protocolo M: como Malaria, con dosis altas
- protocolo N: como Niños y adolescentes
- protocolo O: como Oftalmológico
- protocolo P: como Parásitos, protocolo intenso
- protocolo Q: como Quemaduras
- protocolo R: como Rectal con perilla
- protocolo S: como Sensible, con dosis muy poco a poco
- protocolo T: como Terminal, enfermedades muy graves
- protocolo U: como Urgencia, que es el antiguo protocolo 6 + 6 de Clara
- protocolo V: como Vaginal, utilizando irrigación
- protocolo W: como Wau! Además se puede usar para...
- protocolo X: como detoX, es decir detoxicar metales pesados
- protocolo Y: como inYección de CDI
- protocolo Z: como Zapper, terapia de frecuencias tipo Dr. Rife

QUÉ NO COMER NI BEBER:

1. Espaciar las dosis de las comidas ½ hora y en los medicamentos 1 ó 2 horas.
2. Zumo antioxidantes esperar mínimo 4 horas, mejor evitar.
3. Preferentemente, no mezclar CDS con: café, alcohol, bicarbonato, vitamina C, ácido ascórbico, zumo de naranja, conservantes, o suplementos (antioxidantes), aunque no suelen hacer interacción, pueden neutralizar la eficacia del dióxido de cloro.

ADVERTENCIAS y CONTRAINDICACIONES:

- Cuanto más enferma la persona, más lento debe ser el aumento de la dosis.
- Es **tóxico por inhalación masiva**, hay que evitar su respiración prolongada directa.
- Como interacción hay que tener en cuenta, el uso de los anti-coagulantes (warfarina-coumadina).
- El dióxido de cloro no aumenta la dilución de la sangre directamente, sino que **aumenta la carga eléctrica en las membranas de los hematíes**, cosa que se refleja en el índice de medición.
- Si está tomando un medicamento para una enfermedad "crónica", se disminuye la dosis del mismo paulatinamente, comprobando los niveles de medición muy a menudo (medicación para la hipertensión, diabetes).
- Algunas personas informan de síntomas parecidos a los de un resfriado cuando se utiliza CDS.
- Esto puede producirse por patógenos encapsulados en la mucosidad de la nariz o los pulmones de un resfriado anterior, llamado *biofilm*. Los gérmenes a veces se encapsulan en el moco endurecido pero siguen vivos.
- El gas ClO₂ es conocido en la industria de saneamiento de aguas, ya que es capaz de eliminar *biofilm*, debilita el moco y los antiguos gérmenes del resfriado.

PROTOCOLO A: COMO AMATEUR O PRINCIPIANTE:

La primera toma son 3 ml de CDS en 200 ml de agua, antes de dormir, el primer día de tratamiento.

El segundo día se toman otros 3 ml de CDS en 200 ml de agua, una hora después del desayuno y otros 3 ml de CDS en 200 ml de agua, antes de dormir.

El tercer día se toman las 2 dosis anteriores, después del desayuno y antes de dormir, añadiendo otra dosis una hora después de comer.

Luego se sigue con las mismas 3 dosis, una hora después del desayuno, comida y antes de dormir, el tiempo necesario del tratamiento, hasta que se sienta recuperado.

Este protocolo es apto para ser aplicado a largo plazo y también sirve de mantenimiento.

PROTOCOLO B: COMO BÁSICO

Habitualmente se comienza con una dosis baja de 6 ml de CDS diarios, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante los 3 primeros días; después se aumenta la dosis a unos 12 ml, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante los próximos 4 días; después hasta 18 ml diarias, añadiéndolos a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante 7 días, y finalmente hasta 24 ml, añadiéndolas a una botella de 1 a 1.5 litros de agua, durante un período de 7 días más.

La dosis diaria siempre debe tomarse a lo largo del día, dividida de 8 a 12 partes (pueden hacerse marcas en la botella). Es recomendable ir bebiendo cada hora un poco, durante el resto del tratamiento, cuya duración estándar es de tres semanas, o el tiempo necesario de tratamiento, hasta que se sienta recuperado.

Si se experimentan náuseas, se reducirá la dosis al nivel anterior:

6 ml de CDS 3 días en una botella de 1 a 1.5 litros de agua.

12 ml de CDS 4 días en una botella de 1 a 1.5 litros de agua.

18 ml de CDS 7 días en una botella de 1 a 1.5 litros de agua.

24 ml de CDS 7 días en una botella de 1 a 1.5 litros de agua.

Cuanto más enferma esté una persona, más lento tiene que ser el aumento de la dosis.

PROTOCOLO C: COMO CDS

Se añaden 10 ml de CDS 3000 ppm (o 100 ml de CDS 300 ppm) a 1 litro de agua, por día.

Se toma cada hora una parte, hasta terminar el contenido de la botella (de 8 a 12 tomas).

En caso de enfermedad grave o peligro para la vida debe elevarse la dosis, lenta y progresivamente, en dosis separadas, tomadas a lo largo del día y según como se sienta, llegando hasta 30 ml por litro de agua. Si fuera necesario tomar más, hay que preparar otra botella de agua. Debe reducirse la dosis si se siente malestar o náuseas. ***No se deben superar 80 ml en 12 tomas diarias*** (6 ml/h para 100 kg). La duración del tratamiento sería el tiempo necesario, hasta que se sienta recuperado.

- 10 ml de CDS 3000 ppm (o 100 ml de CDS 300 ppm) + 1 litro de agua, por día.

El protocolo C, es el que se utiliza para poder tratar la mayoría de las enfermedades y también para hacer una ***limpieza general de toxinas o 'détox'***. Es también un procedimiento de desintoxicación, probablemente el más eficaz que se conoce. Hasta la fecha no da problemas de efectos secundarios o interacciones indeseadas, y no suele causar diarrea. Si se están tomando otros medicamentos,

debe mantener una distancia prudencial de tiempo, de una a dos horas, para que no se pierda la eficacia del CDS. Se puede *añadir ¼ parte de agua de mar, en caso de desmineralización.*

PROTOCOLO D: COMO DERMATOLÓGICO, PARA LA PIEL

Se llena un pulverizador de spray con CDS 0,3% (3000 ppm) y se aplica sobre la zona afectada. Se aplica directamente sobre la piel en caso de heridas, quemaduras u otros problemas cutáneos. La solución no debe causar ardor o quemazón, más bien calma el dolor y el sangrado. Se puede repetir la operación varias veces al día (incluso 1 vez por hora). En algunos casos sensibles, como las mucosas, puede ser necesario rebajar la concentración con un poco de agua.

PROTOCOLO E: COMO ENEMAS

Utilizar 10 ml de CDS activado por cada litro de agua templada, a temperatura del cuerpo aproximadamente. Los irrigadores intestinales suelen ser de 2 litros aproximadamente. Se aplica un poco de Ghee, aceite de coco, vaselina o crema a la punta del mismo, mientras se introduce en el recto. La mejor posición es estar tumbado en el lado derecho para facilitar la penetración fácil del agua. Se abre la válvula y empieza a llenarse el colon. Se puede hacer en varias tandas pequeñas o también de una sola vez, según las condiciones y el bienestar de la persona.

Se intenta retener el líquido durante unos tres minutos antes de evacuar, para incrementar la eficacia. Más de cinco minutos no es necesario.

Este protocolo es esencial en casos de enfermedades crónicas hepáticas, parasitosis, autismo y demás enfermedades gastrointestinales.

Según el grado de la enfermedad y condición del paciente, se suele aplicar hasta una vez al día, preferiblemente por la noche, antes de dormir. Como regla general se utiliza cada dos o tres días durante una o dos semanas. Hay reportes de personas que han utilizado este protocolo hasta dos veces al día, durante un tiempo prolongado, para enfermedades graves, sin haber tenido efectos negativos secundarios en la mayoría de los casos. Lo mejor sería adaptarlo a cada persona. Se le puede añadir agua de mar: 1 parte agua de mar + 3 de agua dulce.

A muchas personas les ha resultado muy útil el sistema YOGUI:

- 3 noches seguidas
- 3 noches: una sí y una no
- 3 noches: cada 3 días
- 3 noches, una por semana

Aunque este protocolo es eficaz, para hemorroides y fisuras rectales es más fácil aplicar el protocolo P de perilla.

- La mayoría de las enfermedades tienen su origen en el sistema gástrico intestinal
- CDS elimina la toxicidad y deshace las adherencias
- Si se elimina la toxicidad, se reduce la fatiga
- CDS elimina biofilm, bacterias, cándida, hongo, materia fecal encapsulada y parásitos

PROTOCOLO F: COMO FRECUENTE

1 dosis: 1 ml de CDS cada 15 minutos, durante 1 hora y 45 minutos en ocho tomas = 8 ml de CDS en 1 litro de agua. Se puede agregar 8 ml de CDS 0.3%, en una botella de 1 litro de agua (destilada

o mineral) y dividir la botella en 8 partes iguales, marcándolas con unas líneas, e ir bebiendo una marca cada quince minutos.

PROTOCOLO G: COMO GAS, CUANDO ES UTILIZADO SÓLO EL GAS DEL DIÓXIDO

1. Protocolo vaso:

Se activan de 6 a 8 gotas de DC, en un vaso, sin añadir agua. Se pone de manera inmediata la zona afectada sobre la parte abierta del vaso (la boca), de manera que no salga el gas, y sin que el líquido en ningún momento toque la piel. La duración de la exposición habitualmente, es de 3 minutos, *no debe pasar de los 5 minutos*, para no causar irritación. El tratamiento suele hacerse entre 1 y 3 minutos y se puede repetir las veces necesarias, con un intervalo de 1 hora cada vez.

2. Protocolo bolsa:

Este protocolo se utiliza cuando hay que tratar grandes partes de la piel, o no es posible la ingestión. En primer lugar nos fabricaremos un saco de dormir con 2 bolsas de basura grandes, pegadas entre sí, de manera que nos permita introducirnos en el interior del saco cómodamente, quedando todo tapado, excepto la cabeza, que siempre deberá permanecer fuera del saco, *evitando de esta manera respirar los vapores*.

Para que el gas llegue a todas las partes, es recomendable desnudarse antes de meterse en la bolsa. Seguidamente se activan 30 gotas de DC en un recipiente de cristal o porcelana, sin añadir agua, introduciéndolo en el saco abierto. Entonces se introduce la persona elevando la bolsa hasta el cuello, cerrando firmemente desde dentro con las manos. Activar 30 gotas de DC sin agua, introduciendo el recipiente en el interior de la bolsa, antes de meterse dentro desnudo.

PROTOCOLO H: COMO HABITACIÓN, PARA EVITAR CONTAGIOS

Protocolo de habitación, para evitar el contagio o afecciones pulmonares:

Activar 6–12 gotas según el tamaño de la habitación en un vaso seco, sin agregar agua, colocándolo en el dormitorio, donde se evapore lentamente. Su funcionamiento es muy eficaz contra el contagio de su compañero, si él está durmiendo a su lado, o si hay más de 1 niño en la misma habitación. Deje el DC a unos 2 metros de distancia de la persona enferma. Cuanto más calor haga por la habitación, más rápido se produce la evaporación. Si se quiere ralentizar el proceso de evaporación, se puede añadir una cucharada de agua a la mezcla.

Activar 6 a 12 gotas de DC sin agua en un vaso.

PROTOCOLO I: COMO INSECTOS Y PICADURAS

En el protocolo I o protocolo Insectos se puede utilizar el CDS para picaduras, lo más rápido y eficaz es el CDS si está a mano. Como habitualmente el CDS se guarda en frigorífico tiene la ventaja de reducir la hinchazón de manera inmediata.

Procedimiento: se empapa una gasa o pañuelo de papel con CDS. Se aplica dejándolo directamente sobre la picadura o mordisco y se deja secar. Se comprueba si hay aguijón o pincho para ser extraído. Se puede repetir el proceso las veces que sea necesario y no hay necesidad de lavar con agua posteriormente. También vale para quemaduras.

Esto puede ser utilizado para todo tipo de picaduras de insectos, mordeduras de arañas o medusas

PROTOCOLO J: COMO ENJUAGAR, PROTOCOLO BOCA

Dosis: 10 ml de CDS en un vaso de 200 ml de agua. Inicialmente, enjuaguen la boca y hagan gárgaras 3 a 4 veces al día durante 3 minutos. Más tarde, una sola vez al día. Otra forma es usando el cepillo de dientes, cepillar los dientes y masajear las encías. Para las inflamaciones en profundidad añadir 1 ml de DMSO (ver más abajo) a la mezcla.

PROTOCOLO K: COMO KIT, COMBINADO CON DMSO

Protocolo de aplicación: En casi todas las enfermedades de la piel, como acné, psoriasis, eczema, pie de atleta, heridas, etc. se suele usar aplicando CDS en la piel, seguido por DMSO como máximo hasta 10 veces al día, cada hora. Para esto, se mezclan 20 ml de CDS con unos 50 ml de agua en una botella de spray. Manteniéndolo fresco y oscuro estas soluciones estables aguantan durante varios días hasta una semana o más, en recipientes de cristal incluso meses. Posteriormente se agregan tres cucharaditas de DMSO + una cucharadita de agua en un vaso pequeño. ***No se deben usar botellas de plástico ABS o PET o guantes de goma*** ya que podrían ser disueltos por el DMSO y transportados a través de la piel.

Las botellas de PE o HDPE son correctas. Se aplica CDS hasta 10 veces al día como máximo, rociándolo sobre la piel, frotando el DMSO diluido posteriormente con la mano. En caso de tratamiento a gran escala, se alternan cada hora las áreas de la piel tratada. Se hace este procedimiento durante 3 días a la semana y luego se permite a la piel regenerarse durante los otros 4 días. En caso que aparezca sequedad excesiva en la piel, hay que diluir más las soluciones o frotar aloe vera o aceite de oliva virgen en la piel para calmarla. En el caso de aparecer demasiada sequedad con irritación, reduzca la dosis o descanse del tratamiento.

- ***En ningún caso se debe guardar el DMSO en botellas con gotero de goma, ya que lo diluye contaminando la solución.***

PROTOCOLO L: COMO LAVADO, PROTOCOLO DE BAÑO

Descripción del proceso:

- Se utiliza una bañera completamente limpia y sin jabones u otros aditivos de baño. Se puede utilizar el agua del grifo, ya que ***el dióxido de cloro elimina los metales pesados por oxidación.*** Para personas muy sensibles se puede usar agua muy caliente, dejándola reposar unos minutos en la bañera para que se evapore el cloro común que contiene.
 - Los baños de desintoxicación de agua tibia o caliente con 2-4 kilos de sal marina simple, absorben los ácidos de nuestro cuerpo a través de la piel. Es un proceso conocido como ósmosis, donde se intenta mantener la densidad equilibrada entre dos o más fluidos.
 - Así, el fluido de mayor densidad, pasará a través de la piel hacia el fluido de menor densidad creando equilibrio. De esta manera, los ácidos y toxinas fluyen hacia fuera de nuestro cuerpo. De la misma manera el cuerpo absorberá, por medio de los poros de la piel, los minerales de la sal marina. Por ésta y por otras razones ***no se recomienda sal yodada, ni con ningún aditivo químico.***
1. Se limpia bien la bañera. No hay que poner ningún jabón ni otros productos químicos en el agua.

2. Se activan 30-60 gotas de DC con activador HCL 4% en un vaso, dependiendo de la cantidad de agua que utilice. A mayor cantidad de agua, más cantidad de dióxido de cloro.
3. Se llena la bañera con agua a temperatura corporal. No añadir jabón, perfume, champú, ni juguetes de niños procurando buena ventilación del baño.
4. Añadir el DC activado en la bañera y mover para repartirlo bien. La cantidad de agua no reduce la cantidad de gas ClO₂ que está siendo liberado.
5. Se toma el baño mojando bien todo el cuerpo, incluso cabeza y cuero cabelludo. No hay que preocuparse en el caso que entre agua en los ojos ya que en esta dosis tan diluida DC no daña.
6. Se puede añadir después más agua caliente, porque el calor dilata los poros y así penetra más al interior del organismo.

PROTOCOLO M: COMO MALARIA, CON DOSIS ALTAS

En el procedimiento para la malaria aguda en adultos se toman dos dosis únicas de 15 ml de CDS en 100-200 ml de agua, más una segunda dosis de 15 ml de CDS en 100-200 ml de agua una a dos horas después. La mayoría de los síntomas deberían haber desaparecido unas tres horas después de la segunda dosis. Si los síntomas persisten se aplican 3 ml de CDS en 100-200 ml de agua por cada hora posteriormente. En caso de náuseas se reduce la dosis. Se sigue el tratamiento pero no con más de 3 ml de CDS en 100-200 ml de agua por hora. En caso de niños se aplica hasta 1 ml de CDS por cada cuatro kilos de peso corporal en 100-200 ml de agua.

Si tras este procedimiento el paciente continúa enfermo, entonces no será por la malaria, será por otra enfermedad. Se confunde muchas veces el dengue con la malaria, ambos son transmitidos por un mosquito, pero mientras la *malaria es un parásito*, el *dengue es un virus* y el protocolo adecuado es el *Protocolo F*.

También se puede utilizar un protocolo alternativo más avanzado.

Malaria protocolo avanzado

Si el paciente adulto está muy debilitado:

- 8 ml de CDS en 100-200 ml de agua en la primera toma
- 5 ml de CDS en 100-200 ml de agua en la segunda hora
- 5 ml de CDS en 100-200 ml de agua en la cuarta hora
- 6 ml de CDS en 100-200 ml de agua en la sexta hora
- 8 ml de CDS en 100-200 ml de agua en la octava hora
- 8 ml de CDS en 100-200 ml de agua Al dormir

Total del día: 40 mls

La malaria debe desaparecer utilizando este protocolo un solo día. En caso de que no remita la fiebre al final del día, aumentar una última toma de 10 ml en 100-200 ml de agua. Para bebés: 4 tomas diarias, de 1 ml en 100-200 ml de agua cada 3 horas. Aumentar 2 ml más, si es necesario. Para niños: 5 tomas diarias de 1 ml en 100-200 ml de agua cada 2 hs, por cada 11 kg de peso. Administrar por 2 días.

PROTOCOLO O: COMO OFTALMOLÓGICO/OTORRINO (NASAL)

El protocolo O o protocolo Oftalmológico/Nasal consiste en la fabricación de gotas para uso oftalmológico o nasal, el procedimiento es el siguiente:

Se mezclan en un frasco de cristal pequeño con gotero de polietileno (el polietileno (PE) es más duro que la goma).

- 50 ml de suero fisiológico salino
- 5 ml de CDS
- 3 ml de DMSO

Se aplican cinco gotas cada dos horas en el ojo (nariz) afectado

Las gotas oftalmológicas y nasales se guardarán en un sitio oscuro y fresco y tienen una duración de 100% eficacia durante unos tres días. Después disminuyen rápidamente, así que se recomienda volver a preparar nuevamente. No hay peligro de infección, debido a que es un líquido desinfectante, simplemente que la eficacia se merma con los días.

PROTOCOLO P: COMO PARÁSITOS, PROTOCOLO INTENSO

Nota: este tratamiento no utiliza medicamentos antiparasitarios sistémicos que son absorbidos por el cuerpo. Para esto es mejor un Zapper de alta gama como el Biotrohn® ya que elimina parásitos en sangre sin intoxicar. Este protocolo está diseñado también para poder ser usado en niños, sin causar una carga tóxica excesiva en la sangre y el cuerpo, debido a su duración y dosis. No hay que confundir *Mebendazol* con *Albendazol* (albenza) que sí es sistémico y requiere una receta médica. Si aprecia una clara infestación de parásitos en sangre, se debe consultar con un médico para confirmarlo, y sólo entonces se aplicarían antiparasitarios sistémicos, que sí serán absorbidos por la sangre, según el criterio del médico. Las marcas de estos antiparasitarios varían en cada país, por lo tanto se utiliza en este protocolo la sustancia activa química principal. Debe consultar la marca con su farmacéutico.

Día 1

- Pamoato de Pirantel (dosis única mañana) 10 mg/kg, administrados en una única toma junto con algún líquido. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mgr (para 60 kg tres cucharaditas de 5 ml). En forma de comprimidos tomar 3 pastillas para 60 Kg.
- Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.

Día 2

- Mebendazol (dos dosis) 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema. Equipo adicional necesario: enema de 2 litros.

Día 3

- Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas.

- Mebendazol (dos dosis) 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema.

Día 4

- Mebendazol (dos dosis) 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema.

Día 5

- Pamoato de pirantel (dosis única) 10 mg/kg. administrados en una única toma junto con algún líquido. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mgr (para 60 kg, tres cucharaditas de 5ml). En forma de comprimidos tomar 3 pastillas para 60 Kg.
- Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema.

Día 6

- Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas.
- Mebendazol 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema.

Día 7

- Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema.

Día 8

- Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.
- Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Enema.

Día 9 al 18 (primer mes)

- Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.
- Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día, con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.

- Infusión de *Neem* (*Azadirachta Índica*) (9 días). Tres cucharaditas rasas de té en un litro de agua. Hervir durante 5 minutos e ir tomando durante todo el día. Pueden usar también las cápsulas de *Neem* ya que la infusión es muy amarga.
- Enemas de la manera más continuada posible.

Día 9 al 18 (segundo mes)

- Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.
- Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Infusión de Epazote (*Chenopodium Ambrosioides*) (3 días). Hervir 1 o 2 cucharadas de hojas para 1 litro de agua durante 10 minutos, dejar reposar y colar. Beber 1 taza en ayuno durante 3 días seguidos
- El resto de los días en ayunas tomar el gel de Aloe Vera con zumo o agua.
- Enemas de la manera más continuada posible.

Día 9 al 18 (tercer mes)

- Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberán repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.
- Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente líquidos. Mañana y tarde.
- Infusión de *Neem*. Durante 9 días o infusión antiparasitaria alternativa.
- Enemas de la manera más continuada posible.
- Si después del tercer mes, todavía están saliendo parásitos o grandes cantidades de mucosidades, se puede seguir con el protocolo empezando desde el primer mes otra vez.

Día 19 al 30 (descanso)

Los efectos adversos del *mebendazol* son, en general, poco frecuentes dada su poca absorción. Puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Normalmente estos efectos son generados por la liberación de toxinas del propio parásito al morir. Puede administrarse de manera muy efectiva con una pequeña perilla por vía anal 10 ml diluidos en un poco de agua tibia, se introduce en el recto, desde donde llega al intestino grueso, y se deja actuar durante toda la noche. Está especialmente indicado en el caso de oxiuriasis. No interactúa con DC ni CDS.

Mebendazol (Vermox) no interactúa con dióxido de cloro:

Mebendazol (Vermox) si interactúa con:

- Tagamet
- Ethotoin
- Penicilina
- Zithromax
- Amoxicilina
- Mephenytoin
- Carbamazepina
- Flagyl

La interacción más importante de drogas con Vermox (mebendazol) es Flagyl (metronidazol) ¡Esto es muy importante! NO tome / dar mebendazol y metronidazol juntos. Cuando se usan juntos, podrían causar el síndrome de Stevens- Johnson, que puede ser muy grave.

Rompepiedras: '*Lepidium latifolium*' (rompe-piedra) se pueden hacer varias infusiones bebidas de las hojas al día. El *Lepidium Latifolium* elimina los oxalatos, que son los residuos de calcio anteriormente mencionados.

También hay en gotas. Siga las instrucciones del paquete: adultos de 20 a 25 gotas, niños mayores 15 gotas y niños pequeños 7 gotas.

Neem: preparar un té de las hojas, 1 bolsa de té en 1 litro de agua (si es necesario agregar *stevia* por ser amargo). Se pueden utilizar también las cápsulas de *neem*.

Aceite de ricino: 1 cucharadita para los niños más pequeños, 2 cucharaditas para los niños más grandes. Otra opción es tomar aceite de ricino en cápsulas.

Agua de mar isotónica:

Mezclar 1 parte de agua de mar con 3 partes de agua mineral.

Peso hasta 14 kg (30 libras): 10 ml. agua de mar + 30 ml. agua mineral.

Peso 14-23 kg (30 a 50 libras): 20 ml. agua de mar + 60 ml. agua mineral.

Peso 24-35 kg (55 a 75 libras): 30 ml. agua de mar + 90 ml. agua mineral.

Peso mayor de 35 kg (75 libras): 50 a 150 ml. agua de mar + 150 a 450 ml. agua mineral.

Más agua de mar mezclada con agua se puede dar (3 veces al día o más) cuando se necesiten más minerales.

PROTOCOLO Q: COMO QUEMADURAS

Hay dos formas de tratarlas: si se trata de una quemadura grave es preferible aplicar CDS 0.3% (3000 ppm) directamente en forma de spray, encima de la quemadura. Habitualmente se siente alivio nada más aplicar.

- Se puede también empapar una servilleta en CDS y dejarla aplicada sobre la zona. La ventaja de hacerlo así, es que se puede repetir varias veces y no es necesario lavarlo posteriormente ya que no produce quemadura química por pH.

Protocolo R: como Rectal con perilla

Se coloca 6 ml de CDS en un vaso con 150 ml de agua a temperatura corporal. Se absorbe con una perilla eliminando el aire interior y se aplica vaselina o crema lubricante en la punta de la misma. Posteriormente se introduce en el recto vaciando la perilla por completo. Se retiene durante unos tres minutos el líquido antes de evacuar.

Este protocolo es óptimo para fisuras anales, hemorroides, y sobre todo en cáncer de próstata donde se aplica después de cada defecación. Es un protocolo simple y sin efectos secundarios, pero muy eficaz.

PROTOCOLO S: COMO SENSIBLE, CON DOSIS MUY POCO A POCO

El protocolo S o protocolo Sensible está pensado para las personas que no son capaces de ingerir CDS de la misma manera que la mayoría.

Se utiliza CDS al ser más llevadero y porque tiene menos efectos secundarios.

Para esto se utiliza 1 ml de CDS para 500 ml de agua repartidos durante el primer día. El segundo día se utilizan 2 ml de CDS en 1 litro de agua. Si no hay contratiempos (y normalmente no los hay) se puede incrementar a partir de aquí la dosis cada día, a 1 ml más por litro, hasta llegar a los 10 ml de CDS por litro de agua.

Esto son los protocolos más importantes, más protocolos específicos lo encuentra en el libro "Salud Prohibida"